Рисунок 1


% пациентов
6
5
4
3
2
1
0
ОР 0.83 (95% ДИ, 0.73–0.95)
P=0.005
Плацебо
Дапаглифлозин
0
180
360
540
720
900
1080
1260
1440
дней

Рисунок 2



p	0,005		
95% ДИ	0,73 - 0,95	0,71 - 0,98	0,67 - 1,04

Рисунок 3



p	0.17		
95% ДИ	0,84 - 1,03	0,71 - 1,02	0,86 - 1,20

Дапаглифлозин

Плацебо

Рисунок 4



p	0.17	0.17		
95% ДИ	0,84 - 1,03	0,67 - 0,87	0,82 - 1,04	0,43 - 0,66

* Устойчивое снижение (на 40% и более) расчётной скорости клубочковой фильтрации (рСКФ), развитие терминальной стадии почечной недостаточности или смерть от почечной либо сердечно-сосудистой причины)

** Почечная конечная точка без смерти от СН

Дапаглифлозин

Плацебо

Рисунок 5


7.020
10.142
17.160
% пациентов
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
99,2%
0,8%
65,6%
34,4%
40,6%
59,4%
EMPA-REG
CANVAS
DECLARE-TIMI 58
Кол–во пациентов в исследовании
Название исследования
Пациенты с установленными АССЗ
Пациенты с факторами риска развития АССЗ

Рисунок 6

ПАЦИЕНТЫ С ССЗ	ОР	95% ДИ	
EMPA-REG OUTCOME	0.86	0.74	0.99
CANVAS Program	0.82	0.72	0.95
DECLARE-TIMI 58	0.9	0.79	1.02
Общий результат (p=0·0002)	0.86	0.8	0.93
ПАЦИЕНТЫ С ФАКТОРАМИ РИСКА			
CANVAS Program	0.98	0.74	1.3
DECLARE-TIMI 58	1.01	0.86	1.2
Общий результат (p=0·98)	1	0.87	1.16